

BOLLETTINO

DI

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

N. 266 pubblicato il 14 Dicembre 1896

VOL. XI

Dott. M. G. PERACCA

Assistente al Museo Zoologico di Torino.

Nuovo genere di Colubride aglifo dell'America meridionale.


Synophis n. g.

Denti mascellari superiori in numero di 16, piccoli, crescenti leggermente in lunghezza dall'avanti all'indietro; denti palatini 9-10 subeguali; pterigoidei 21-22 più piccoli, decrescenti leggermente all'indietro; mascellari inferiori subeguali. Capo distinto dal collo, occhi grandi, sporgenti, a pupilla rotonda; internasali piccolissimi; prefrontali uniti in un largo scudetto; corpo leggermente compresso, snello; scaglie striate, carenate, senza impressioni apicali, in 19 serie. Coda assai lunga; anale intero; subcaudali in due serie. Ipapofisi sviluppate nella parte posteriore della colonna vertebrale (dorsale), in forma di carena rialzata, più elevata posteriormente.

Synophis bicolor, n. sp.

Capo distinto dal collo; muso arrotondato, non prominente. Rostrale triangolare, appena visibile guardando il capo dal di sopra, rappresentante quasi un triangolo equilatero, più largo che alto, ad angolo superiore arrotondato, a superficie fortemente concava, rientrante.

Internasali piccolissimi, due volte più larghi che lunghi; prefrontali riuniti in un largo scudetto, in contatto cogli internasali, col nasale, col loreale, col preoculare, e col frontale; frontale pentagonale, tanto largo quanto lungo, lungo od appena più lungo della distanza che intercede tra il suo margine anteriore e la punta del muso, più corto dei parietali; parietali assai larghi; nasale unico, scavato, colla narice



aprentesi nella sua porzione anteriore; loreale piccolo, quadrangolare, più lungo che alto; un preoculare assai grande in contatto col frontale; sopraoculare piccolo assai ristretto in avanti; postoculari due, di cui il superiore assai grande, l'inferiore piccolissimo; temporali 1 + 2; labiali superiori otto, di cui il quarto ed il quinto formano il margine inferiore dell'orbita; labiali inferiori nove, di cui i primi cinque in contatto col primo paio di scudetti mentali, che sono appena più lunghi degli scudetti del paio posteriore. Scaglie in 19 serie, striate finamente (come nel gen. *Streptophorus*), debolmente carenate, senza impressioni apicali. Ventrali 180; anale intero; subcaudali 136 in doppia serie (i sei urostegi che precedono l'apertura anale sono *unici*). Coda contenuta 2 volte e $\frac{3}{4}$ nella lunghezza totale.

Colorazione. Parti superiori uniformemente brune, più chiare sui fianchi; labbra superiori, angolo della bocca e parti inferiori bianco-gialliccie.

Località. America meridionale. Un solo esemplare giovanissimo.

Questo nuovo genere pare molto affine al gen. *Streptophorus*, D. & B. secondo il parere anche del Dr. Boulenger al quale lo comunicai.

— — — — —